

太醫院經驗奇效良方大全

奇効良方卷之十四

泄瀉門

附論

素問云春傷於風夏必飧泄邪氣留連乃為洞泄叔和云濕多成五泄腸走若雷奔此因氣血虛弱肌膚不密邪氣薄於腸胃因虛襲之遂成此證但泄瀉人為一證耳豈知泄者泄漏之義時時澹泄或作或愈瀉者一時水去如注泄名有五有胃泄脾泄大腸泄小腸泄有大瘕泄胃泄者飲食不化色黃脾泄者腹脹滿泄注食即嘔吐逆大腸泄者食已窘迫大便色白腸鳴切痛小腸泄者澀而便膿血小腹痛大瘕泄者裏急後重數至圊而不能便莖中痛又有飧泄腎泄洞泄濡泄胃寒腸熱泄驚澹泄之分且飧泄者始春之時風木盛行脾土受風木之邪夏以伏陰在內或當風取涼過食生冷復傷脾胃不能消化飲食水穀完出而脉弦細名為飧泄腎泄者由腎虛每於五更時澹泄一

二次而連月經年弗止水泄者謂臟腑虛寒四肢厥冷暴頻洞
下洞泄者手足厥冷心腹痛脚轉筋驚澹者少腹生寒則為此
證蓋陰中之至陰脾也脾胃虛弱為風寒所勝則陰氣太盛陰
盛則臟寒臟寒則糟粕不化大便黑狀似驚澹大腸有寒證亦
如之又云濁寒之氣在上清熱之氣在下則脹滿而泄也且大
腸為傳送之官胃為水穀之海其精英則流布以養五臟其糟
粕則傳送以歸大腸且如傷食一證因失肌傷飽胃不能消則
脹滿所下酸臭可驗此證當疎利消道前證諸瀉以脉論之大
抵泄瀉非特在脾腎經亦有當以各類推之治法以分利為先
實脾土益元氣用藥無不効矣

泄瀉通治方

理中湯 治腸胃虛弱瀉瀉有聲泄瀉頻併

人參

白朮

乾薑

甘草

炮炙各二錢半

加茯苓

厚朴薑製各二錢

右作一服水二鍾生薑三片棗一枚煎至一鍾不拘時服

調中湯 治腸虛泄瀉止嘔進食

藿香

縮砂

蓬朮炮

乾薑炮

肉桂

茴香炒

草菓各一錢

麥芽炒

益智仁

橘紅

蒼朮

神麴炒

桔梗

甘草炙各半錢

右作一服水二鍾生薑三片紅棗二箇鹽少許煎至一鍾

不拘時服

肉豆蔻散

治脾虛腸鳴泄瀉不食

肉豆蔻

七枚每一枚剉一錢納乳香一丸以麴置罈中去麴不用

右碾為細末分作二服不拘時用米飲湯調下

平胃散

治傷濕泄瀉

蒼木三錢

厚朴薑製

橘紅各二

甘草炙一

右作一服水二鍾生薑三片紅棗二箇前一鍾不拘時服

六和湯 治心脾不調氣不升降霍亂吐瀉或致泄瀉寒熱交

併小便赤澀

方見暑門

加味五苓散 治伏暑發熱及胃實泄瀉或煩渴小便不利

赤茯苓去皮木猪苓去皮澤瀉

白木各二

車前子

肉桂各一

右作一服水二鍾生薑五片前至一鍾不拘時服

厚朴丸 治泄瀉不止

白龍骨

乾薑炮

附子炮去

厚朴薑製

訶子煨去

肉豆蔻煨陳皮各一

右為細末酒煮糊為丸如梧桐子大每服五七十九空心

用米飲送下

補脾丸 治滑泄不禁

肉豆蔻麩煨 川厚朴薑製 川白薑炮

赤石脂

白朮各一 神麴炒 麥蘖炒

附子炮去

萸撥各五

石為細末醋煮糊為丸如梧子大每服五十丸空心用

米飲送下

大藿香散 治一切脾胃虛寒嘔吐霍亂心腹撮痛如泄瀉不

已最能取効

藿香一兩 陳皮 厚朴薑製 青皮麩炒

木香 人參 肉苳蔻麩煨 良薑炒

麥蘖炒 神麴炒 訶子煨去 白苳蔻去皮

甘草炙各 白乾薑炮三

右為細末每服三錢空心用生薑湯調服如水瀉滑泄腸風臟毒米飲湯調下赤白痢甘草黑豆湯調下脾胃虛冷宿滯酒食痰氣作暈入鹽少許生薑紅棗湯調服胃氣吃噫生薑自然汁一呷入鹽少許調服此藥大能消食順氣利膈開胃

四神丸 治脾泄腎泄

肉苳蔻

生用破故紙炒

木香

不見火 茴香

炒各

右為細末生薑煮棗肉為丸如梧桐子大每服八九十九空心用鹽湯送下一方去木香茴香用神麴麥蘖各炒一

兩為丸

五附丸 治腸胃虛弱內受風寒水穀不化泄瀉注下

肉苳蔻

麴煨

附子

炮去皮 白茯苓

去皮各 木香

不見火

乾薑

炮

肉桂

各二 丁香

不見火

片為細末生薑汁煮麪糊為丸如梧桐子大每服五七十
九或至一百丸用生薑湯送下粥飲亦可

肉苳菟散

治脾胃虛弱腹脇脹滿水穀不消臟腑滑泄

肉苳菟

麪果

乾薑

炮

厚朴

薑製

陳皮

去白

甘草

炙各

茴香

肉桂

訶子皮

川烏

炮去皮

各一兩

蒼朮

米泔浸

炒四兩

右為細末每服二錢用生薑紅棗煎湯不拘時調服

金鎖正元丹

治腎虛泄瀉小便頻數盜汗遺精一切虛冷之

證並皆治之

五倍子

茯苓

去皮各

龍骨

煨

硃砂

另研各

肉苳菟

洗焙

紫巴戟

去心

葫蘆巴

炒各

補骨脂

酒浸

炒

右為細末和勻酒煮糊為丸如梧桐子大每服五七十丸

空心用溫鹽酒送下

荳附丸 治臟腑久虛下寒泄瀉不止腸滑不禁日夜無度全

不進食一切虛寒泄瀉困乏

肉荳蔻麩裏 附子炮去 訶子麩裏 良薑炒

乾薑炮 赤石脂煨 陽起石煨 白礬枯

龍骨生用各二兩 白茯苓去皮 桂心不見 細辛先各一

右為細末酒煮麩糊為丸如梧桐子大每服七十九空心

用米飲送下

燒胃丸 治脾胃虛冷疼痛泄瀉

乾薑 厚朴二味同 附子炮去 茯苓去皮

陳皮 桂心不見 訶子皮 甘草炙各

右為細末醋煮糊為丸如梧桐子大每服三十九食前用

米飲送下

訶梨勒丸 治大腸虛冷泄瀉不止腹脇引痛飲食不化

訶梨勒

煨熟

青皮

陳皮

吳茱萸

龍骨生用

白茯苓去皮細辛洗

桂心煨不見

薑搗

右為細末生薑汁煮麴糊為丸如梧桐子大每服八九十

丸空心用米湯送下

九寶飲子

分利水穀止泄瀉

罌粟殼

炙

赤茯苓

去皮

陳皮

木通各二

黃耆微炒

厚朴

薑製

青皮

各一

車前子

微炒

粉草炙

右作一服水二鍾煎至一鍾食前服

實腸散

治泄瀉不止

蒼朮二

訶子

煨

縮砂

肉荳蔻

陳皮

茯苓

各半

木香

甘草

炙各半

厚朴

剉製

右作一服水二鍾生薑五片紅棗三箇煎一鍾不拘時服

升陽除濕湯 治脾胃虛弱不思飲食腸鳴腹痛泄瀉無度小

便黃色四肢沉困

蒼朮

米泔浸

半夏

湯泡

益智

羌活

防風

去蘆

神麴

柴胡

去苗

升麻

各一

猪苓

陳皮

各六分

麥蘖

炒

甘草

炙各四分

右作一服水二鍾生薑三片紅棗二枚煎至一鍾食前服

益胃湯 治頭悶勞動則微痛不喜飲食四肢怠墮燥熱短氣

口乾不知味腸鳴大便微澀黃色身體昏悶並皆治之

蒼朮

二升

當歸稍

陳皮

各

升麻

一升

益智

白朮

人參

柴胡

黃芩

各九分

半夏

黃耆

升麻

各六分

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾去滓食前通口服
白朮芍藥湯 治太陰脾經受濕水泄注下體重微滿因弱無
力不欲飲食暴泄無數水穀不化宜服此藥

白朮

芍藥

各五

甘草

各二

右作一服水二鍾煎至一鍾食前服

升陽湯 治一日大便三四次澹而不多有時洩瀉腹中鳴小

便黃

黃耆

甘草

橘皮

升麻

七分

柴胡

當歸身

益智

紅花

少許

右作一服水二鍾煎至一鍾食前溫服

止瀉秘方

人參

白朮

乾薑

訶子

去核

茯苓

去皮

木香

藿香

去上

甘草

炙

肉苳蔻

藥性寒各

右作一服水二鍾煎至一鍾去滓食前通口服

飲腸丸 治久瀉

木香

丁香

附子炮去

縮砂仁

訶子皮

罌粟殼

去灰

川薑

沒石子

白龍骨

肉苳蔻

藥性寒

赤石脂

梓州厚朴薑製

禹餘糧

醋淬七次

右為細末麪糊為丸如梧桐子大每服七十九食前用米

飲湯送下

訶子四柱散

治臟腑虛怯元氣弱脾胃不快不進飲食時加

洩利晝夜不息

附子

炮去

白茯苓

去皮

人參

去蘆各

木香

藥性寒

訶子

藥性寒各半兩

右件呪咀每服三錢水一盞生薑三片棗一枚煎至六分
食前服一方加肉苁蓉一方有白朮真陽耗散兩耳常鳴
臍腹冷痛頭旋目暈四肢急倦脾胃不和晝夜洩痢小便
滑數並宜服之

畢撥丸

治滑泄甚妙

附子

炮去皮

草撥

川薑

炮

丁香

不見火

吳茱萸

炒

良薑

胡椒

各一兩

山茱萸

草苴薏

去皮各半兩

右為細末棗肉為丸如梧桐子大每服五十丸食前陳米
飲下日三服廬州知錄周汝功嘉禾人乃尊守永嘉時每
苦滑泄服此藥果有效此方董發運問有序多不復錄上
二方亦周糾所傳也

縮砂丸

治大便泄瀉米穀不化腹中疼痛不思飲食

縮砂仁

黃連去毒炒

附子炮去

吳茱萸湯洗七

訶子皮

肉苳蔻各二

乾薑炮

木香各半

右為細末水煮麪糊為丸如梧桐子大每服五七十九食

前用米飲送下

羊肉扶羸丸

治脾胃不和不進飲食臟腑虛滑老人皆

可服之

肉苳蔻

白薑地

川椒去目并合口

木香一分

神麴炒

附子炮去皮臍

精羊肉

一斤半微瀝血脉

右為細末煮粟米飯為丸如梧桐子大每服五十九食前

用米飲送下

麴水丸

治時暑暴瀉壯脾溫胃進美飲食及療飲食所傷留

膈痞悶等疾服此取効

神麴炒

蒼朮

米泔浸二宿焙乾等分為末

右為細末水煮麴糊為丸如梧桐子大每服三十九不拘時用米飲送下

百粒丸

治遠近泄瀉大腸滑神効

紅椒

胡椒

附子炮

丁香

乾薑炮

麥蘖

各等分

右為細末酸醋煮大蒜為丸如梧桐子大每服百粒食前用米飲送下

治脾泄多年老人腎虛謂之水土同化

右用吳茱萸湯洗淨不以多少白水煮去滓盡內入鹽少許通口服蓋吳茱萸能暖膀胱水道既清大腸自固餘藥雖熱不能分解清濁也

翹蘄丸

治脾胃中風濕臌脹滑泄不止

神麴

麥蘗

白木

附子炮去皮脰各等分

右為細末麴糊為丸如梧桐子大每服三五十九空心用米飲送下左氏述楚子圖蕭上將漬無社告甲叔展曰有麥麴乎有山麴乎鞠蘗芎蘗也意欲令逃水中以避禍是知芎蘗能除濕予常加木附以製方治脾濕而泄者萬無不中此藥亦治飧泄素問曰春傷於風夏必飧泄飧泄者食谷不化蓋春木旺時肝生風邪滯於脾經至夏飲冷當風故多飧泄此藥尤宜

棗肉丸 治脾腎虛寒或腸鳴泄瀉腹脇虛脹或胃膈不快食不消化宜服

破故紙

四兩

木香

一兩

肉苳蔻

二兩麴裹煨

右為細末燈心煮棗肉為丸如梧桐子大每服七十九空心用生薑湯送下

香茸丸 治飲酒多遂成酒泄骨立不能食但再飲一二匙

作幾年矣

麝香別研 肉苳蔻 一刀 嫩麻茸草火煉去毛

右為細末用白陳米飯為丸如梧桐子大每服五十九空
心用米飲下熱者服酒蒸黃連丸

神授丸 治臟腑滑瀉

南木香半斤 肉苳蔻一斤 兩麩

右為細末煮棗肉為丸如梧桐子大每服三十五丸不拘
時用陳米飲下

治臟腑泄瀉

右用鷄爪黃連不以多少碾為細末用大蒜煨熟去皮研
和丸如梧桐子大每服三十九或五十九米飲下

治瀉父不効者老人尤宜服一名護命方

右用大附子一箇炮去皮臍以韭菜根研爛絞取汁和丸如梧桐子大曬乾每服三十丸米飲湯下不乾恐麻人一方治一切冷瀉出後頗併面無顏色不思飲食并為末以一錢煮粥一椀空心服

胃苓散

治傷暑泄瀉煩渴引飲所下如水

右用平胃散五苓散各二錢用水一盞棗二枚生薑三片同煎至七分嚼薑棗和滓熱服少刻又服辰砂五苓散亦可用來復丹亦可或寒濕水泄正胃散理中湯蘇梅米湯下一方入鹽煎

棗附丸

治臟腑寒滑泄

右用端正大附子一箇乾棗半斤同於銀石器中用水於慢火煮上留水二指許水乾旋添湯煮兩三時取出切作半箇再煮候至晚棗爛壞將附子溫水洗剝去皮臍切作

薄片焙乾搗為末別煮棗肉和丸如梧桐子大每服三四

十九空心用米飲下患滑泄壽死者服之皆愈

治夏月脾胃傷冷滑腸泄瀉肚痛及治霍亂吐瀉不止
右用胡椒末不以多少研爛飯搜和手心內揉勻丸如梧
桐子大每服四十九食前用陳米飲吞下

實腸丸 治腸胃虛弱腹脹泄瀉時上刺痛

黃連爭一刃

肉苁蓉乾薑炮

白茯苓去皮

當歸洗焙

訶子煨去

丁香略半

木香一分

治瀉久不効者老人尤宜服一名護命方

右用大附子一箇炮去皮臍以韭菜根研爛絞取汁和丸
如梧桐子大曬乾每服三十九米飲湯下不乾恐寐入一
方治一切冷瀉出後頗併面無顏色不思飲食拊為末以
一錢煮粥一椀空心服

胃本散

治傷暑泄瀉煩渴引飲所下如水

右用平胃散五苓散各二錢用水一盞棗二枚生薑三片同煎至七分嚼薑棗和滓噍服少刻又服辰砂五苓散亦可用來複丹亦可或寒濕水泄正胃散理中湯蘇梅米湯下一方入鹽煎

棗附丸

治臟腑寒滑泄

右用端正大附子一箇乾棗半斤同於銀石器中用水於慢火煮上留水二指許水乾旋添湯煮兩三時取出切作半箇再煮候至晚棗爛壞將附子溫水洗剥去皮臍切作薄片焙乾搗為末別煮棗肉和丸如梧桐子大每服三四十九粒空心用米飲下患滑泄垂死者服之皆愈

治夏月脾胃傷冷滑腸泄瀉肚痛及治霍亂吐瀉不止

右用胡椒末不以多少研爛飯攪和手心內揉勻丸如梧

桐子大每服四十九食前用陳米飲吞下

實腸丸 治腸胃虛弱腹脹泄瀉時時刺痛

黃連一斤

肉苳菑乾薑炮

白茯苓去皮

當歸洗焙

訶子煨去

丁香各半

木香一分

右為細末用猪膽汁煮麪糊和丸如梧桐子大每服五十丸空心用米飲下

養臟丸 治腸胃虛寒泄瀉無度不進飲食

生硫黃四兩

附子炮去

肉苳菑乾薑炮

鹿角霜

肉苳菑乾薑炮

右為細末麪糊為丸如梧桐子大每服三十九漸加至五

十九用溫米飲下空心食前服

黃連烏梅丸 治飲食不節榮衛不和風邪侵襲臟腑之間致

腸胃虛弱泄瀉腸鳴腹脇脹裏急後重日夜頻併不思

飲食

黃連去須

阿膠炙

當歸二兩

人參去蘆

龍骨煨

赤石脂

乾薑炮

白茯苓去皮

烏梅肉焙乾陳皮去白

訶子去核

肉苳蔻煨

罌粟殼蜜炙

木香略一

右為細末醋煮麪糊為丸如梧桐子大每服五十丸食前

米飲送下如腹痛當歸煎湯下下血地榆煎湯下

煨肝散

治臟腑久虛挾寒滑泄全不入食口生白瘡

川椒去目炒

茴香炒

砂仁

肉苳蔻煨

丁香

木香各半

附子炮去

白朮

四兩上二家各七兩入生薑

右為細末每用二錢用獐豬肝或羊肝二兩切作片子批

開搽藥末在內更用好紙三兩重裹於慢火煨候肝熟取

出細嚼用溫酒送下不拘時候

療二十種雜下 江夏太守用此法藥盡愈

黃連

黃蘗

熟艾

附子炮

甘草

炙各一兩

烏梅

取肉煮乾薑二兩

右七物搗下蜜丸如大豆服十九漸至二十九日三忌肥
肉生冷一方無甘草附子黃蘗一方除甘草附子

木香

訶子皮

白芍藥

當歸炒去蘆

人參

白茯苓

去皮

白朮

甘草

炒各一兩半

御米殼

二兩去麩炒碎

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服七十九用生白薑

絲鹽各少許拌勻用紙裹水濕文武火煨熟却用生薑煮

粥送下食前日進二服

猪臟丸

治元臟久冷滑泄不止飲食不進漸至危困

硫黃

二兩

研末

猪臟

一兩

洗入

五升

同入

內以

水

候乾

乾為度

取出一

後藥

吳茱萸

二升

厚朴

去皮

一升

水

右為末

先研臟令細

次入藥末

一處同研

勻丸如梧子

大每服

十九空

心鹽酒鹽湯下

癸卯歲

冬十月

小雪

薄冰天

令應時

白樞判家一老僕而墜脫

色神氣

衰弱病

脫肛日久

服藥未驗

近日復下

赤白膿痢

作裏急

後重白

多赤少不

任其苦先

師料曰此

非肉食膏

粱必多蔬

食或飲食

不節天氣

應時衣蓋

尤薄寒氣

形體

乃寒滑氣

泄不固故

形質下脫

也當以瀉

去其脫而

除其

滑微酸之

氣固氣上

收去其下

脫以大熱

之劑除寒

補陽

以補氣之

藥升陽益

氣是酌對

其證

訶手皮散

治腸胃虛

寒泄瀉米

穀不化腸

鳴腹痛脫

肛或作

膿血日夜

無度

訶子

去核煨七分

乾薑

炮分

粟殼

去蒂隔紙炒

橘皮

各半

本草十劑云澁可去脫以粟殼之酸微澁上收固氣去脫主用為君也以訶子皮之微酸上收固血治其形脫橘皮微苦溫益真氣升陽為之使以乾薑大辛熱之劑除寒為臣

右為細末分作二服水二盞煎至一盞和滓熱服空心再服全愈

治久患脾泄瀉臟腑虛滑不進飲食

右用青州大棗擘破去核以木杵如棗枝大置棗中十數枚以水一盞煮候棗軟熟食前溫時喫就以煮棗湯送下甚者不過一二劑

龍骨散

治水瀉腹痛不納飲食

龍骨

當歸

炒

肉苁蓉

煨

木香

各

厚朴二兩去粗皮薑汁炙

右為細末每服二錢食前用粥飲調下

代赭石 治水瀉腸鳴臍腹撮痛

代赭石煨乾薑炮

龍骨略一附子炮三分

右為細末研軟飯和丸如梧桐子大每服三十九空心用米飲湯送下日午再服

如聖丸 治水瀉并赤白痢

菹豆烏頭端正大者炮裂去皮膜各等分

右為細末新水和丸如菹豆大以丹砂為衣每服五丸不拘時服白痢乾薑湯下赤痢甘草湯下赤白痢乾薑甘草湯下水瀉新汲水下小兒服一二丸

梅棗湯 治水瀉不止

烏梅十個取肉 棗子十個去核 罌粟殼一個去蒂隔

右剉粗末每服二錢水一盞煎七分去滓不拘時溫服
紅豆九 治臟腑泄瀉名為殮世

紅豆 藿香 糖求 蓬木 煨

鬱金 陳皮 去白 青皮 去穢 甘草 各三

神麴 炒 麥蘖 炒 半夏 湯洗 砂仁 各一

良薑 藁撥 各二 丁香 不見火 硃砂 醋化

右為細末水煮麴為丸如梧桐子大每服一百丸用米
飲或隨物空心送下病甚者日進三服

高良薑湯 治腸胃受風久為殮世下痢嘔逆腹內疼痛

高良薑 木香 檳榔 赤茯苓 去皮

人參 各三 肉苳蔻 去谷 吳茱萸 湯洗 陳皮 湯洗去

縮砂 去皮各 乾薑 一分

右以咀每服四錢水一盞半煎至八分不拘時日三服

乾薑丸

治腸胃風冷飧泄注下腹痛不止

乾薑炮

厚朴

去粗皮

當歸

切焙各三分

阿膠炙

龍骨略一

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十九空心用棗湯下日午再服

木香散

內經曰清氣在下則生飧泄又曰久風入中則為腸風飧泄夫脾胃土也其氣中和以化為事今清氣下降不升則風邪久而干胃是木賊土也故中和之氣不能化而令物完出謂之飧泄或飲食太過腸胃所傷亦致米穀不化此俗呼水穀痢也法當下舉之而消之加以減木香散之

木香

良薑

升麻

檳榔

人參略半

肉豆蔻

吳茱萸

湯洗

陳皮

砂仁

乾薑

炮裂

神麴

炒

右為細末每服四錢水一盞半煎至一盞去滓食前溫服

聖中丸

治脾胃受濕滑泄注下

黃連去須

黃蘗

赤茯苓

白朮

澤瀉

各一兩

陳皮

人參

肉苳蔻

白芍藥

半夏麴

官桂

各半兩

右為細末水浸蒸餅和丸如梧桐子大每服五七十九食

前用溫米飲送下

肉苳蔻散

治腸胃受濕瀉泄不止兼治暴水瀉

肉苳蔻

去殼

訶梨勒

去核

黃連

去須

甘草

炙

赤茯苓

去皮

乾薑

炮

白朮

各半兩

厚朴

去粗皮

薑

右為細末每服二錢空心米飲調下日三

當歸散

治腸胃寒濕瀉瀉腹內疝刺疼痛

當歸以焙

乾薑炮

肉苳蔻炮

法炭

木香

各半

訶梨勒搗去

黃連

去紫炒各三分

右為細末每服三錢用甘草生薑各一分黑豆一合並半

生半炒用水四盞煎取二盞作二次空心日午調服

炙肝散

治飲食生冷內受風寒泄瀉無度

川乾薑炮

大附子炮

縮砂仁

各半

肉苳蔻二兩

小茴香

炒

小川椒四兩

右為細末用白羊肝二三兩或豬羊腰子批開

放燕末三四錢在內益一錢葱白二莖同肝內一處用濕

紙裹煨香熟空心食前細嚼用生薑湯或米湯或酒送下

白苳蔻湯

治腸胃受濕濡瀉無度腹瀉飲食不化

白苳蔻去皮

訶梨勒搗去

陳皮

湯浸

法炭

乾薑

各半

厚朴

去粗皮

生薑

右咬咀每服五錢切薤白三寸水一盞半煎至七分去滓
空心溫服日午再服

華撥丸 治腸胃久寒大便秘澀

華撥

附子

炮裂去

厚朴

去粗皮

肉苁蓉

乾薑

炮裂去

訶梨勒皮

細砂仁

龍骨

各半

右為細末用麪糊和丸如梧桐子大每服二十九食前用
米飲送下日再

龍骨黃連湯 治大便秘澀色如鷺鶩

龍骨

黃連

去鬚切焙

當歸

切焙

乾薑

炮

甘草

炙各

右咬咀每服五錢水一盞半煎八分去滓食前溫服日再

橘皮散

治脾胃虛寒洞泄不止腸內雷鳴氣脹膨滿冷氣

陳皮

去白

白朮

去略

訶梨勒

炮

乾薑

炮

枳殼去穢炒

官桂去粗

木香炮

甘草炙

人參各一

檳榔炮一

草薺寇煨五

半夏湯洗七次薑汁製三分

厚朴去粗皮生薑汁炙一兩半

右為細末每服二錢食前煎生薑棗湯調下

木香訶梨勒丸 治洞泄大腸切痛腸鳴食不化

木香半生

白朮

高良薑炒

肉苳寇去殼各

訶梨勒煨去殼

官桂去粗

無莢炒多一

附子炮製去

厚朴去粗皮生薑汁炙二兩

甘草炙半

乾薑炮一

右為細末用陳麩末煮糊為丸如梧桐子大每服三十九

食前煨生薑鹽湯送下

茱萸斷下丸 治臟腑寒腹痛泄瀉不止甚効

吳茱萸二兩

赤石脂

川薑各半

艾葉炒

縮砂仁

肉苳寇

附子炮去皮脂

右為細末麴糊為丸如梧桐子大每服五七十丸食前用米飲送下趙從簡通判甲辰年丁母憂食素之久苦瀉不止日七八行首尾歲年每服他藥不過一二日後作得此方而愈後數年間遇瀉服之又効

荳蔻附子散

治脾胃久寒大腸虛滑洞泄

肉荳蔻

麴累

附子

去皮

縮砂

半斤

木香

半分

右為細末每服一錢食前用米飲調下

固腸散

治脾胃虛弱內受寒氣泄瀉注下水穀不分冷熱不

調下痢膿血赤少白多或如魚腦腸滑腹痛遍數頻并心

腹脹滿食減乏力並宜服

陳米

炒二

木香

不見火

肉荳蔻

生用

粟殼

去蒂

各二兩

乾薑

炮

甘草

炙各二

右為細末每服二錢酒一盞生薑二片棗一枚煎至七分

不拘時溫服如不飲酒水煎亦得忌酒麪魚腥等物
加味三建湯 治洞泄不止

大川烏

綿附

大雄

三味並炮鹽浸去皮臍

木香

肉苴蔻

煨

訶子

肉去核各一

右劉散每服三錢水一盞生薑十片紅棗二枚鹽梅一箇

陳米一撮煎六分空心熱服

歸煑壯脾丸 治證同前

白茯苓

蒼朮

厚朴

各二

陳皮七錢

甘草

二

訶子

附子

川烏

各一

生薑

半斤

棗子

五七枚

大蒜

十枚去皮臍

右為細末用神麪糊為丸如梧桐子大每服百十九空心

用米飲湯任下

奇効良方卷之十四終

奇效良方卷之十五

氣門 附論

陰陽應象論云喜怒傷氣寒暑傷形暴怒傷陰暴喜傷陽欲氣上行滿脉去形喜怒不節寒暑過度生乃不固故重陰必陽重陽必陰王機真感論云憂喜悲怒怒令不得以其次故令人有大病矣因而喜大虛則腎氣乘矣憂則心氣乘矣怒則肝氣乘矣悲則肺氣乘矣恐則脾氣乘矣升溪云夫氣周流一身以為生者氣也陽往則陰來陰往則陽來一升一降無有窮已苟內不動於七情外不感於六淫其為氣也何病之有世言冷氣滯氣逆氣上氣皆是肺受火邪氣得炎上之化有升無降薰蒸清道甚而至於上焦不納中焦不化下焦不滲張轉變為嘔為吐為膈為噎為痰為飲為胃為吞酸或痞或痛為脹滿或嘈雜或隱或痛或氣或不思食諸證互見後人不明經旨以脉訣熟則生

風冷生氣寒主收引令冷氣上衝氣逆氣鬱矣非冷而何原病
或曰諸氣逆衝上嘔湧溢食不下皆屬於火諸病吐嘔酸皆屬
於熱諸精飲痞膈中滿皆屬於濕然則諸氣諸飲諸嘔吐翻胃
若酸等病豈有寒乎曰五臟各有火五志激之其火隨起若諸
寒為病必須身化寒氣口食寒物乃為病寒非若諸火病自內
作所以氣之病寒者十無一二舉痛論云有病生於氣也怒則
氣上喜則氣緩悲則氣消恐則氣下寒則氣收是則氣泄驚則
氣亂勞則氣耗思則氣結九氣之不同也然諸氣動作皆為熱
也予和云夫天地之氣常則安變則疾非况人稟天地之氣五
運迭侵於外七情交戰於中是以前人惜氣如待至寶庸人投
物而反傷大和此軒岐所以論諸痛皆由於氣百病皆生於氣
遂有九氣不同之說氣本一也因所觸而為九怒善悲恐寒暑
驚思勞也其言曰怒則氣逆其則嘔血及衄泄少氣逆上矣王

太僕曰怒則陽氣逆上而肝木乘脾故甚則嘔吐及於泄瀉則氣和志達榮衛通利故氣緩矣悲則心氣急肺布葉舉而上焦不通榮衛不散熱氣在中故氣消矣恐則精却上則上焦閉則氣還則下焦脹故氣不行矣又曰恐則傷精却上而不下流下焦陰氣亦迴還而不散故聚而脹也熱上焦固禁下焦氣聚故氣下行也寒則腠理閉氣不行故氣收矣又曰身涼則衛氣沉故皮膚之理及參世之靈皆閉密而氣不流行衛氣收斂于中而不散矣則腠理開榮衛通汗大出故氣泄矣又曰入在陽則卻在陰則慘故熱則膚腠開發榮衛大通津液而汗大出驚則心無所倚神無所歸慮無所定故氣亂矣勞則喘息汗出內外皆越故氣耗矣又曰疲勞後則氣奔速故喘息氣奔速則陽外發故汗出內外皆踰越於常紀故氣耗損也思則心有所存神有所歸正氣留而不行故氣結矣又曰繫心不散故氣亦停

留此素問之論九氣其變甚詳其理甚明然論九氣所感之疾則略惟論嘔吐及飧泄餘皆不言惟靈樞論思慮悲哀喜怒憂盛怒恐懼而言其病曰思慮而傷神傷神則恐懼自失破腠脫肉毛瘁色夭死于冬脾憂愁而不解則傷意意傷則恍惚四肢不舉毛瘁色夭死于春肝悲哀動中則傷魂傷魂則狂忘不靜不正陰筋而牽兩脇不舉毛瘁死于秋肺喜樂無極則傷魄魄傷則狂狂者意不存人毛革焦毛瘁色夭死于夏心盛怒而不止則傷志志傷則善忘其前腰脊不可俯仰屈身毛瘁色夭死于季夏脾恐懼不解則傷精傷精則善驚恐精特自下是故五臟主藏精者也不可傷傷則失守而陰虛虛則無氣無氣則死矣又曰神意魂魄志精所主之病然無寒暑驚勞四證余以是推廣之怒氣所至為嘔血為衄泄為煎厥為薄厥為陽厥為胃滿脇痛食則氣逆而不下為喘為煩心為膺痺為肥氣為目

暴盲為耳暴閉筋縱發於外為疳癰毒氣所至為笑不休為毛
華焦為肉病為陽氣不收甚則為狂悲氣所至為陰縮為筋攣
為肌痺為脉痿男為數洩血女為血崩為酸鼻辛頰為目昏為
少氣不能報息為泣則腎脉恐氣所至為破胭脫肉為骨痿痠
厥為暴下渌水為面熱膚急為陰痿為懼而脫頤驚氣所至為
潮涎為口喏為癱瘓為不省人為僵仆久則為瘰癧勞氣所至
為咽噎病為喘促為嗽血為腰痛骨痿為肺鳴為高骨竅為陰
痿為唾血為冥視為耳閉男為少精女為不月衰甚則瀆乎
若壞都汨汨乎不可止思氣所至為不眠為嗜卧為昏瞶為中
疝三焦閉塞為咽噎不利為臍腹嘔苦為筋痿為白淫為慮後
與氣快然如衰為不嗜食寒氣所至為上下所出水液是氣所
至為喘嘔吐酸暴注下迫凡此九者內經有治法但以五行相
勝之理治之夫怒傷肝肝屬木怒則氣并於肝而脾土受邪木

太過則肝亦自病喜傷心心屬火喜則氣并於心而肺金受邪
火太過則心亦自病悲傷肺肺屬金悲則氣并於肺而肝木受
邪金太過則肺亦自病恐傷腎腎屬水恐則氣并於腎而心火
受邪水太過則腎亦自病思傷脾脾屬土思則氣并於脾而腎
水受邪土太過則脾亦自病寒傷形形屬陰寒勝熱則陽受病
寒太過則陰亦自病是傷氣氣屬陽熱勝寒則陰受病熱太過
則陽亦自病凡此七者更相為治盛衰之理經曰脉滑者多血
少氣澁者少血多氣大者氣血俱多脉來大而堅者血氣俱實
小者血氣俱少脉來細而緩者血氣俱虛代者氣衰細者氣少
浮而絕者氣辟大而滑中有短氣尺脉瀋而堅為血實氣虛大
脉細而微者血氣俱不足也劉立之脉理玄要曰下手脉沉便
知是氣沉極則伏瀋弱難治其或沉滑氣康痰飲且入身稟天
地陰陽以生籍血肉以成其氣一氣同流以成其神形神相附

乃謂全體故陰陽升降血脉流行榮衛運轉五臟六腑相養相生皆氣之使也蓋天地有五行而變化生風寒暑濕燥之順逆順之平逆之害人有五臟亦生喜怒哀思恐故曰根於化育者天地之泰和其體自安發於疾疫者陰陽之乖戾大抵氣鬱在上宜以散之氣鬱在下當以利之此則舉其大概言之工於醫者當推脉證治之

氣通治方

三香正氣散

治陰多陽少手足厥冷氣刺逆滯胃脘噎塞

心下堅痞嘔噦酸水

木香

丁香各半

陳皮去白

厚朴去粗皮蜜製

益智仁

縮砂仁

香附子炒去毛

甘草各一錢半

乾薑炮

丁香皮

蓬莪朮炮

烏藥各一錢

右作一服用水二鍾生薑三片紅棗一枚煎至一鍾去滓

不拘時服

沉香降氣湯

治三焦痞滯氣不宣暢心腹疼痛嘔吐痰沫五

噎五膈並皆治之

沉香

木香

丁香

藿香葉

人參

去蘆

白朮

甘草

炙

肉苁蓉

桂花

檳榔

陳皮

去白

縮砂

川薑

炮

枳實

炒

白檀香

各一

白茯苓

去皮

青皮

去白

白芷

各二分

右作一服用水二鍾入鹽少許煎至一鍾不拘時服

紫沉通氣湯

治三焦氣滯不能宣通腹脇脹大便秘

紫蘇葉

枳殼

炒

陳皮

去白

赤茯苓

去皮

檳榔

甘草

少

沉香

麥門冬

去心

木香

五味子

桑白皮

黃耆

乾生薑

薄荷葉

荊芥穗

子實

乾炒各半

右作一服用水二鍾煎至一鍾空心溫服

異香散

治腎氣不和腹脇膨脹飲食難化噎氣吞酸一切

冷氣結聚腹中刺痛並皆治之

石蓮肉

去皮半小蓬朮

益智仁

去殼

荊三棱炮

甘草

炙各三錢

青皮

去白

陳皮

去白

厚朴

去皮

薑制各一

右作一服用水二鍾生薑三片紅棗一枚鹽一捻同煎至

一鍾不拘時熱服

順氣木香散

治氣不升降胃膈痞悶嘔吐及酒食過

度噎氣吞酸心脾刺痛女人一切血氣凝滯並皆治之

木香

蒼朮

米泔水浸

桔梗

去蘆

茴香

乾薑

陳皮

去白

縮砂仁

厚朴

去皮

薑制

丁香

良薑

炒

肉桂

去粗

甘草

炙各

二錢

右作一服用水二鍾生薑三片紅棗二枚煎至一鍾不拘時熱服入鹽少許亦可

和氣散

治脾胃不和中脘氣滯心腹脹滿嘔吐酸水

青皮去白

茴香炒

蒼朮米泔浸

陳皮去白

肉桂去粗皮

良薑去薑皮

香附子炒去毛

甘草炙各一兩

桔梗去蘆三兩

右為細末每服二錢鹽少許沸湯調服

化氣湯

治一切氣逆胃膈噎塞心脾卒痛嘔吐酸水丈夫

小腸氣婦人血氣並治之

沉香

胡椒各一兩半

縮砂去殼

桂心去粗皮

木香各一兩

乾薑炮

蓬朮煨

青皮去白

茴香炒

陳皮去白

丁皮

甘草炙各二兩

右為細末每服二錢生薑三片蘇葉湯調下婦人淡醋湯調服

蠟慈散

治男子婦人脾胃虛冷氣滯不行攻刺心腹痛

膀胱小腸腎氣疼痛及婦人血氣刺痛並皆治之

延胡索

肉桂去粗皮

乾薑炮各

蒼朮米泔水浸一宿切焙

甘草炙各

縮砂去皮

檳榔

丁香錢半

三稜煨

蓬朮煨

茯苓去皮

青皮去白各

右作一服用水二鍾連根慈白一葉煎至一鍾空心熟服

木香流氣飲

治諸氣痞塞不通胃膈膨脹面目虛浮四肢

腫滿口苦咽乾大小便秘

陳皮去白

半夏湯洗

厚朴去皮

青皮去白

紫蘇葉

香附去毛

肉桂去皮不見火

蓬朮煨

丁香不見火

大腹皮

檳榔

藿香葉

木香不見火

藁藥

甘草炙各

木通去節

麥門冬去心

香白芷

赤茯苓去皮

白朮

乾木瓜

人參去蘆

石菖蒲各半

右作一服用水二鍾生薑三片紅棗二枚煎至一鍾不拘時熱服

鹽煎散

治男子婦人一切冷氣攻冲胃膈刺痛不已及脾

胃虛冷嘔吐泄瀉膀胱小腸氣婦人血氣並皆治之

縮砂仁

去殼

蒼朮

米泔水浸一宿

茯苓

去皮

草菓去皮

川芎

肉苳蔻

茴香

炒

萆澄茄

大麥芽

檳榔

良薑

炒

枳殼麩炒

厚朴

去皮

陳皮

去白

羌活

去蘆

甘草炙

右作一服用水二鍾入鹽少許煎至一鍾空心熱服

雞舌香散

治心脾引痛中脘氣滯傳積痰飲胃膈脹滿陰

陽不和臟腑虛弱並皆治之

香附子

炒去

肉桂

去皮

赤芍藥

天台烏藥

良薑

二各

甘草

錢半

右作一服用水二鍾入鹽少許煎至一鍾服

分心氣飲

治一切氣留滯於胃腸之間不能流暢以致嘔

悶噎塞不通大便虛秘

木香

不見

丁香

人參

去薑

麥門冬

大腹皮

大腹子

桑白皮

草果仁

桔梗

去薑

厚朴

去皮薑

白木

各半

香附子

藿香

去土

紫蘇葉

去薑

陳皮

去白各一分半

甘草

右作一服用水二鍾生薑三片紅棗二枚去核燈心十莖

煎至一鍾食後服

七氣湯

治七情之氣鬱結于中心腹絞痛不可忍者

人參

去薑

肉桂

去皮

甘草

各半

半夏

右作一服用水二鍾生薑五片煎至一鍾食後服

蘇合香丸

專能順氣化痰治傳屍骨蒸諸症等際卒暴心痛

鬼魅瘴瘧赤白下痢小兒驚搐等證並皆治之

沉香

麝香

訶梨勒核去

丁香

青皮

安息香別研為末用無

香附子炒去毛

萆撥

白朮

白檀香

犀角

硃砂二升

各研

黃陸香別研

龍腦去

蘇合香油入安息香膏

右件研為極細末和勻用安息香膏并煉蜜和劑每一兩

作五丸不拘時用溫水化下一丸或溫酒化服或生薑湯

磨化服亦可

撞氣阿魏丸

治五種噎疾九般心痛痞癖氣塊冷氣攻刺腹

痛腸鳴嘔吐酸水丈夫小腸氣婦人血氣並皆治之

茴香炒

青皮去白

陳皮去白

蓬朮地

川芎

甘草炙

生薑同 兩切片當歸同 一兩切片當歸

肉桂 去皮

縮砂仁

丁香皮

白芷 醋半

胡椒

阿魏 醋浸一宿同炙

右為細末用阿魏和麵糊丸如鷄頭大硃砂為衣每服二

三九丈夫氣痛炒薑鹽湯下婦人血氣刺痛醋湯下

沉香降氣湯 治陰陽壅滯氣不升降胃脘痞塞喘促短氣又

治脾胃留飲噫噎吞酸脇下妨悶

沉香 半兩

縮砂仁 附十二

甘草 各三

右為細末每服二錢入鹽少許沸湯調服不拘時

香飲子 治七情所傷遂成七疝心脇引痛不可俛仰

檀香

木香

乳香

沉香

丁香 見並大

藿香 各半

玄胡索 炒

片子薑黃 炒

川烏 炮去

桔梗 炒薑

桂心 炒

甘草 半兩

右作一服用水二鍾生薑五片棗子一枚煎一鍾食遠服

益智仁湯

治疝氣連小腹痛甚不已診其脉沉緊是腎經有

積冷所致

益智仁

乾薑炮

茴香炒

甘草炙各

烏頭炮

三分

青皮去白

一錢

右作一服用水二鍾生薑三片入鹽少許煎一鍾空心服

四陽湯

治仁歷氣中脉急大弱飲食不進

乾薑炮

益智仁

四錢

青皮去白

三分

川烏

生去皮

一錢半

附子

生去皮

一錢半

右作一服用水二鍾生薑五片紅棗一枚煎至一鍾食前

服入木香一錢前亦可

復原通氣散

治氣不宣流或成瘰癧并閃挫腰脇氣滯疼痛

並皆治之

舶上茴香炒 川山甲同

各二兩

延胡索炒

牛乳

陳皮 去白

甘草 炙 兩

南木香 一兩 不見火

右為細末每服二錢用熱酒調病在上食後服病在下食前服不飲酒者煎南木香湯調下

手粘散 治心脾氣痛

延胡索

五靈脂

草蓂

沒藥 各等

右為細末每服三錢不拘時熱酒調

流氣飲子

治男子婦人五臟不和三焦氣壅心胃痞悶咽塞

不通腹脇膨脹嘔吐不食上氣喘急咳嗽痰盛面目浮四

肢腫大便秘澁小便不通憂思太過鬱結不散腹脹脇肋

走注疼痛脚氣腫痛並皆治之

紫蘇葉

青皮 去白

當歸 洗

芍藥

烏藥

茯苓 去皮

桔梗

半夏

湯洗

川芎

黃芩

枳實 炙炒

防風

去蘆

陳皮去白

甘草炙各

木香

大腹皮

檳榔

枳殼炙炒各

右作一服用水二鍾生薑三片紅棗一枚煎至一鍾去滓不拘時服

分氣紫蘇飲

治男子婦人脾胃不和胃膈噎塞脇疼氣促喘

急心下脹滿飲食不思嘔逆不止

紫蘇

五味子去梗

桑白皮炙

陳皮去白

桔梗去蘆

草薢仁

大腹皮

茯苓去皮

甘草炙各

右作一服用水二鍾生薑三片煎一鍾入鹽少許食遠服

勻氣散 治氣滯不勻胃膈脹滿虛痞宿冷不消心腹刺痛噎

塞嘔吐惡心並皆治之

丁香

檀香

木香

白芷炙各

藿香葉

甘草

炙

縮砂

四兩

右為細末每服二錢入鹽一字沸湯調服不拘時

指迷七氣湯 治七情相干陰陽不得升降氣道壅滯攻衝作

寒宜服

香附子

二錢

青皮

去白

陳皮

去白

桔梗

蓬朮

官桂

藿香

益智仁

半夏

湯洗七次

甘草

炙各一錢

右作一服用水二鍾生薑三片紅棗二枚煎一鍾食遠服

四七湯 治喜怒憂思悲恐驚之氣結成痰涎狀如破絮或如

梅核在咽喉之間咯不出嚥不下此七情所為也中脘痞

滿氣不舒快或嘔飲嘔逆惡心並皆治之

半夏

湯洗七次

茯苓

去皮各三錢

紫蘇葉

厚朴

薑製各二錢

右作一服用水二鍾生薑七片紅棗二枚煎一鍾食遠服

沉香化氣丸 治諸氣

茯苓 人參 去蘆 木香 不見 青皮 去白

丁香 沉香 不見 白朮 山藥

砂仁 三稜 蓬朮 菖蒲

廣榔 橘皮 白荳蔻 各六分 官桂 一兩

蘿蔔子 炒 二兩 香附子 炒 二兩 黑牽牛頭末 八兩

右為細末醋煮糊為丸如梧桐子大每服五七十丸不拘

時生薑湯下

桔梗枳殼湯 治諸氣痞結滿悶

桔梗 去蘆 枳殼 炒 各 甘草 炙 一分

右藥一服用水二鍾生薑五片煎至一鍾食遠服

導氣枳殼丸 治氣結不散心胃疼痛氣逆上攻分氣逐水

枳殼 炒 木通 青皮 去白 陳皮 去白

桑白皮炒

蘿蔔子炒

白牽牛炒

蓬朮煨

茴香炒

三棱煨

右為細末薑汁煮麪糊為丸如梧桐子大每服三五十丸不拘時橘皮湯送下

蘇子降氣湯

治虛陽上攻氣不升降上盛下虛痰涎壅盛喘

促短氣煩悶胃膈噎塞中脘不快心腹脹滿咳嗽痰涎留飲停積不消並皆治之

紫蘇子炒

半夏湯洗各半前胡去蘆

甘草炙

厚朴去皮

薑剉陳皮去白

川當歸去蘆

肉桂去粗皮

右作一服用水二鍾生薑三片煎至一鍾不拘時服

神保丸

治諸氣刺痛流入背脊及脇下諸藥不能治者

木香

胡椒各一

全蝎上炙

巴豆十箇去心研

右為細末湯浸蒸餅丸如麻子大硃砂為衣每服五九心

腹痛痞蒂燈心湯下腹痛痞蒂生薑湯下血痛炒薑蒲湯
下肺氣甚者白礬蛤粉各三分黃丹一分研為末煎桑皮糯米飲下腎氣脇下痛茴香酒下大便不通蜜湯調檳榔末
一錢下氣噎木香湯下宿食不消茶酒漿飲隨意送下不
拘時服

三和散 治五臟不調三焦不和心腹痞滿脇肋脹風氣壅
滯肢節煩疼頭面虛浮手足微腫腸胃燥澀大便秘難年
高氣弱並可服之

羌活去蘆

宣木瓜

沉香

苦節

陳皮各半

紫蘇

白木

檳榔

木香

大腹皮

甘草

炙各一錢

右作一服用水二鍾煎一鍾不拘時服四磨湯亦可兼服
百首錢散 治七情所傷滯於胃膈塞於咽喉脹痛於心下噎

氣吞酸不能飲食

白芷

薤白

縮砂

丁香

木香

甘草一分

青皮

陳皮

桂心

各二分

厚朴薑製

香附三分

右咬咀每服三錢用水一盞生薑三片鹽一捻煎至七分

不拘時服

集香丸 治一切氣胃脘痛悶脇肋脹滿心腹疼痛吐氣吞酸

嘔逆惡心不思飲食或因飲酒過傷脾胃不和並皆治之

白芷

薤仁

木香不見

薑黃略四

丁香

六兩

麝香別研

甘草二兩

香附子八錢

右為極細末入麝香末和勻用甘草膏和為丸如梧桐子

大每服一二九不拘時細嚼津嚥下常服寬中順氣消宿

酒進飲食滯積滯去癥塊

三和丸 治三焦不和氣不升降心胃痞悶脇肋疼痛瘵因傷

冷傳化

枳實炒

檳榔

半夏湯浸

蓬朮各三

木香

青皮去白

陳皮去白

赤茯苓去皮

丁香皮

蘿蔔子炒

白朮各一

荆三稜四兩

白芷麩

桂心

沉香

藿香各一

黑牽牛

頭新炒

右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服三十九至五十九

食後用生薑湯下

寬中丸

治氣不升降痰涎鬱塞飲食不化

檳榔炒

半夏生薑

木香各二

荆三稜各錢

青皮

陳皮各半

黑牽牛

頭末二兩

右為細末水煮麵糊為丸如梧桐子大每服五十九食后

用生薑湯送下

沉香升降散 治一切氣不升降脇肋刺痛腎膈痞塞

沉香

檳榔 各半

人參

大腹皮 炒

訶子 碎

白木

烏藥

香附子 炒

紫蘇葉

厚朴

去粗皮

神曲 炒

麥蘖 炒

荆三稜

蓬朮

各

益智仁 各二

陳皮 去白

薑黃

甘草

各四兩

右為細末每服二錢食前用沸湯調服一方加紅花

木香檳榔丸 治一切氣滯心腹滿悶脇肋膨脹大小便結滯

不快利歲逆酸臭宿食不消

此者木香檳榔

示是子和之方

治腎水陰不足

又服養陰發湯

諸虛腫滿流濕

又名潤燥通腸

破積通和血氣

痰涎不利胃室

酒積食傷同治

泄瀉腹脹膝脫 手足四肢無力 飲食面色痿黃
脾肺骨蒸勞嗽 更兼口舌生瘡 打撲內傷閃墜
驢馬咬蛇傷 與敗往來客旅 不服水土他鄉
諸般雜證同治 調理偏宜此方

木香

檳榔

青皮

商枳殼 麩炒

陳皮

蓬朮

黃連

黃蘗

香附

大黃

黑牽牛

生料四兩

右為細末滴水和丸如梧桐子大每服三十丸或五十丸
加至微利為度食后生薑湯下如不利加丸數服常服快
氣消食通潤大腸一方無黑牽牛一方有當歸黃芩各一
萬和散 治男子婦人一切氣刺氣悶氣脹食傷及中毒積滯
兩脇臍下四肢收注宿有氣疾心腹痞塞嘔吐不思飲食
傷風煩悶鼻出清水夜多盜汗漸致瘦弱腸滑水瀉不上

等疾皆治之

茵香性

蘿蔔子生

蓬木無難

桂心各一

白芷半一兩

陳皮一分

麥蘖一分

乾薑一分

甘草三分一兩

白木米一升水一宿

牽牛炒熟取頭

荆三稜濕紙裹煨

右為細末每服一錢水八分煎至六分加滓稍熱服或入

棗煎如湯點服亦得婦人血氣入當歸少許心痛炒茴香

酒調下中酒熱酒調下小兒久瀉不止及瀉後傷動胃氣

不思飲食瘦悴並以一錢棗半枚水五分煎四分熱服

引氣丸 治一切滯氣

枳砂研

安息香研

麝香研各一分

白芥子二百六

大戟末

牽牛末各一

牛黃研半

巴豆皮一七粒去

五靈脂研

乳香研

沒藥研各一兩

斑蝥起頭足研

塊氣丸

右同研勻用糯米飯和丸如麻子大臨時隨意湯使下

官桂

延胡索

蓬朮

薑黃

砂仁

枳實

枳殼

黑牽牛取頭

檳榔

大黃醋煮

當危

史均子取旬

白豆蔻

丁香各半

羌化酒浸

香附子醋浸

荆三稜

陳皮去白

胡椒各一

皂角半斤去皮

沉香

木香各四

錫灰四錢

川烏二錢半

糖絨

青皮各一

大麥芽四兩

江子去油

蘿蔔子

二兩用紅子

江子去油

左為末酒糊丸如梧桐子大每服五七丸

各隨後項湯使下有孕婦人不可服之忌一切熱物

婦人一切血氣當歸酒下

熱手泥湯下小兒脫肛艾

湯下小兒妳脾橘皮湯下小兒驚風一歲一丸薄荷湯下
白痢乾薑湯下小兒脾積史均子猪膽蘆薈湯下赤痢其
草湯下一切吐逆生薑湯下心膈膨脹新水下元冷好
酒下風熱閉塞大小便不通并花水豆粉調下婦人紅脉
不通紅花當歸酒下赤白帶下蔓荊子湯下血昏當歸酒
下產前產後吳茱萸一兩重酒一升煎至二沸下血塊氣
血等生薑橘皮煎湯入醋少許下常服者淡薑湯下小女
紅脉不通紅花當歸酒下男子小腸氣茴香湯下咳嗽烏
梅湯下腰疼牽牛湯下傷寒葱白湯下

升降氣六一湯

香附子

炒六兩

藿香葉

一兩

右為細末每服二錢食前白沸湯點服

工聖散

治諸般氣痛

芫花

醋煮乾

延胡索

焙一兩半

右為細末每服一錢男子元臟氣痛葱酒調下癰疾赤烏

梅湯下婦人血氣痛當歸酒調下諸般氣痛薄荷湯調下

小腸氣茴香湯調下

勝金散

治男子婦人五臟氣一切冷氣血氣肥氣息實氣痞

氣奔豚氣伏梁氣疾捨心切痛不可忍似絞築定冷汗喘

急不語欲絕痛冷立止

天合烏藥

細剉酒浸一宿微炒

茴香

炒

青皮

去白

良薑

醋

右為細末每服二錢空心用溫酒調服婦人用薑煎童子

小便調服

醪醑丸

順氣寬胃進美飲食

木香

甘草

丁香枝

薑黃

醋

右為細末煉蜜丸每兩作四十九每服一九細嚼溫水下

溫中分氣丸 治三焦氣不升降胃膈滿悶

南星 半夏 香附二兩三味用薑汁半盞米醋半盞水一盞可煮乾

白朮 茯苓 木香一分 青皮

陳皮 良薑 乾薑四兩水一盞同煮半

右為細末酒煮麴糊為丸如梧桐子大每服三十九不拘時湯飲任下不拘時服

疎氣丸 治上氣腹脹

大黃酒洗一兩 檳榔三 郁李仁去殼陳皮各一兩

青皮去白 枳殼炒 羌活 川芎各半

檀香 木香各一分

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九用生薑湯

送下食後臨卧時服

半夏湯 治上氣嘔吐不能下食

半夏湯洗

陳皮白

白木

甘草剉

桂心各半

人參一兩

厚朴去粗皮薑剉

右以咀每服五錢水一盞生薑五片棗三枚煎至七分去

滓溫服日三

按氣散 治上氣嘔逆及疎利過多虛氣上攻又短氣少氣噎

悶宜服

木香

人參

白茯苓去皮 藿香葉

陳皮去白

枳殼炒

甘草炙

附子一枚剉

右為細末每服二錢煎紫蘇木瓜生薑湯調再入銀匙重

湯煎五七沸溫服

無比沈香丸 治男子婦人諸物所傷通身走注疼痛多年沉

積不散嘔吐惡心胃脘不利心腹刺痛人痢不止助腦脹

痛一切冷氣不和婦人胎前產後諸疾並皆治之

沉香

檀香

木香

乳香

沒藥

各半

丁香

香附

去

八角茴香

蓬朮

炮

胡椒

官桂

荊三稜

醋煮

良薑

青皮

陳皮

去白

巴豆

炒去油

川烏

炮

草烏

炮

大麥蘖

川椒

去目炒各

右為細末用醋煮麴糊為丸如櫻桃大每服一九用棗一枚燒熟去核同藥細嚼用冷米飲送下心腹急痛用冷水送下傷損腸內痛煎乳香湯下積聚亦如前法服後以乾物壓之忌熱物大有神効食後臨卧時服

太醫院經驗奇效良方卷之十五 終